



MODULO SSE
CAPITOLO 1

TRAUMA APPROFONDIMENTI

LA VALUTAZIONE SECONDARIA

Addetto al Soccorso Sanitario Extraospedaliero

Struttura Formazione AREU

**DEFINIRE LO SCOPO DELLA VALUTAZIONE
SECONDARIA**

A-B-C-D-E

**ACQUISIRE LO SCHEMA DI
COMPORTAMENTO PER LA
VALUTAZIONE SECONDARIA**

SCOPO

Ha lo scopo di evidenziare segni e sintomi da comunicare alla SOREU per favorire la scelta e l'allertamento dell'ospedale adeguato

Si effettua successivamente alla valutazione/assistenza primaria

Deve essere breve (pochi minuti), standardizzata, schematica

Non deve mai ritardare il trasporto del paziente in condizioni critiche

Può essere eseguita anche durante il trasporto in ambulanza, su indicazione della SOREU



**IN QUALUNQUE FASE SI
RISCONTRI UN
PROBLEMA
IMPREVISTO O SE
IL PAZIENTE VARIA LE
PROPRIE CONDIZIONI,
IL SOCCORRITORE
DEVE RIFARE L' ABCDE
PRIMARIO SEGUITO
DALL'EVENTUALE
ASSISTENZA MIRATA**

**MANTENERE L'OSSERVAZIONE
CONTINUA ED ATTENTA**

LIVELLO DI COSCIENZA


COMPORTAMENTO

DOLORE

PARAMETRI VITALI



ESAME TESTA PIEDI



TESTA

COLLO

ARTI

TORACE

ADDOME

ARTI

OSSERVA



SENTI



PALPA



ESAME TESTA PIEDI

TESTA

OSSERVA

SCALPO:

ferite – gonfiori - depressioni

ORECCHIE:

traumi – otorrea – otorragia - ematoma mastoideo

NASO:

edema – deformità – rinorrea -
rinorragia



ESAME TESTA PIEDI

TESTA

OSSERVA

OCCHI:

edema – ematomi - ferite

MANDIBOLA:

mobilità


BOCCA:

avulsioni dentarie, sangue, vomito, ferite



ESAME TESTA PIEDI

COLLO



OSSERVA

PRESENZA STOMIE

PRESENZA DI CORPI PENETRANTI


FERITE APERTE

PALPA

DEFORMITA'

ESAME TESTA PIEDI

TORACE



OSSERVA

SIMMETRIA RESPIRATORIA

EMATOMI FERITE

SENTI

ASPIRAZIONE dell'ARIA


PALPA

CREPITII

**VALUTAZIONE
DEL DOLORE**

ESAME TESTA PIEDI

ADDOME



OSSERVA

FERITE PENETRANTI EMATOMI
EVISCERAZIONI


PALPA

CONSISTENZA (contratto-rilassato)

VALUTAZIONE DEL
DOLORE

ESAME TESTA PIEDI

ARTI



OSSERVA

EMATOMI – FERITE- COLORITO

DEFORMAZIONI

MOTILITA' e SENSIBILITA'

SENTI

TEMPERATURA CUTE POLSI PERIFERICI

PALPA

CREPITII . DEFORMITA'

**VALUTAZIONE DEL
DOLORE**

Durante la valutazione secondaria confermare la dinamica del trauma e raccogliere una breve anamnesi

- A** Allergie
- M** Medicamenti
- P** Patologie precedenti
- I** Ingestione alimenti
- A** Altro correlato all'evento



La valutazione secondaria consente la ricerca di lesioni specifiche in pazienti stabili favorendo la **SOREU** nella scelta e allertamento dell'ospedale adeguato